

3. Proberodung Zuckerrüben vom 15.09.2026/ 3^{ème} sondage de récolte du 15.09.2026

Region West

Région ouest

Probedatum Date du sondage	Rüben- ertrag Rendement en racines t/ha	Verhältnis Blatt:Rüben Proportion feuilles:racines	Zucker- gehalt Taux de sucre %	Zucker- ertrag Rendement en sucre kg/ha	K	Na	N-am	Ausbeute Extractibilité %	Niederschläge seit 1. April Précipitations à partir du 1er avril mm ¹⁾
15. September	64.8	0.3	15.3	10'065	4.6	0.5	3.7	83.0	295
18. August	48.2	0.3	17.4	8'342	4.7	0.5	3.9	84.6	183
+ / -	16.6	0.0	-2.1	1'723	-0.1	0.0	-0.2	-1.6	112
Vergleichswerte Valeurs comparatives									
2021 21. Sept.	72.1	0.6	14.7	10'628	4.0	0.4	0.8	87.7	685
2022 20. Sept.	88.1	0.3	15.0	13'599	4.1	0.5	1.3	87.1	414
2023 19. Sept.	82.7	0.3	14.8	12'219	4.1	0.4	1.6	86.5	367
2024 17. Sept.	88.6	0.4	14.2	12'561	4.3	0.4	1.6	85.7	474
2025 16. Sept.	100.5	0.2	15.4	15'456	4.2	0.4	1.7	86.7	473
Ø 2021 - 2025	86.4	0.4	14.8	12'893	4.1	0.4	1.4	86.7	483

¹⁾ www.agrometeo.ch Ø Studen BE, Moudon VD und Changins VD

Region Ost

Région est

Probedatum Date du sondage	Rüben- ertrag Rendement en racines t/ha	Verhältnis Blatt:Rüben Proportion feuilles:racines	Zucker- gehalt Taux de sucre %	Zucker- ertrag Rendement en sucre kg/ha	K	Na	N-am	Ausbeute Extractibilité %	Niederschläge seit 1. April Précipitations à partir du 1er avril mm ¹⁾
15. September	67.8	0.2	15.9	10'802	4.6	0.6	2.9	84.7	271
18. August	50.4	0.3	19.1	9'521	5.4	0.5	4.3	85.3	208
+ / -	17.4	-0.1	-3.2	1'281	-0.8	0.1	-1.4	-0.6	63
Vergleichswerte Valeurs comparatives									
2021 21. Sept.	83.7	0.5	16.3	13'091	4.0	0.3	0.7	89.2	701
2022 20. Sept.	101.1	0.3	16.2	16'390	4.1	0.4	1.5	87.7	494
2023 19. Sept.	99.0	0.4	15.9	15'671	4.6	0.4	1.5	87.1	503
2024 17. Sept.	82.2	0.4	15.4	12'660	4.4	0.3	1.2	87.5	560
2025 16. Sept.	104.2	0.3	15.8	16'469	4.3	0.3	1.3	87.6	499
Ø 2021 - 2025	94.0	0.4	15.9	14'856	4.3	0.3	1.2	87.8	551

¹⁾ www.agrometeo.ch Ø Steinmaur ZH, Uesslingen TG, Uhwiesen ZH

Kommentar siehe nächste Seite bzw. Rückseite
Commentaire, voir page suivante resp. au verso

Dritte Proberodung – unterdurchschnittliche Ertragserwartungen bestätigen sich

Die dritte Proberodung hat die bereits niedrigen Erwartungen aus der zweiten Proberodung grossmehrheitlich bestätigt. Zwar kam es seit Mitte August im gesamten Anbaugebiet zu Niederschlägen, diese konnten das Defizit aus den heissen und trockenen Sommermonaten jedoch nicht kompensieren. Insbesondere auf Feldern mit starkem Rüsslerbefall hat sich die Ertragssituation weiter verschärft. Dies zeigt sich auch in den aktuellen Zahlen. In beiden Regionen konnte gegenüber der zweiten Proberodung noch ein gewisser Ertragszuwachs festgestellt werden. Der erwartete Rübenenertrag stieg um 16,6 t/ha in der Region West und um 17,4 t/ha in der Region Ost. Zu beachten ist, dass die von Hand durchgeführten Proberodungen erfahrungsgemäss rund 15 bis 20% höhere Erträge ausweisen als die maschinelle Ernte.

Der Anstieg der Hektarerträge geht jedoch mit einer teilweise deutlichen Abnahme der Zuckergehalte einher. Dadurch wird der Mengenzuwachs beim Rübenenertrag zum grossen Teil wieder aufgehoben. Entsprechend liegen auch die erwarteten Zuckererträge pro Hektar deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Zusätzlich erschwert die klar unterdurchschnittliche Ausbeute die Situation. Ursache dafür sind unter anderem die infolge der Trockenheit erhöhten Amino-N-Gehalte in den Rüben. Hohe Amino-N-Gehalte erschweren die Kristallisation der Saccharose und führen dadurch zu höheren Zuckerverlusten in der Melasse. In der Westschweiz rechnet die Schweizer Zucker AG derzeit mit einem Totalausfall von schätzungsweise 400 bis 800 ha. Diese Zahl ist mit Vorsicht zu interpretieren und kann sich je nach Entwicklung der Parzellen noch verändern. Die Pflanzerrinnen und Pflanzler werden deshalb aufgefordert, Totalausfälle der Schweizer Zucker AG zu melden. Dies ermöglicht eine möglichst effiziente Planung der Logistik und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden. Mit den sinkenden Temperaturen nimmt das Risiko von Sekundärinfektionen ab. Bis Ende Oktober wird empfohlen, die Rüben möglichst nahe am Verladetermin zu roden, da sie sich im Boden besser halten als in Mieten. Die Verladepläne bleiben wie vorgesehen bestehen. Betroffene Parzellen sollten weiterhin regelmässig überwacht werden. Ein allfälliges Auftreten von Fäulnis ist der Schweizer Zucker AG zu melden. Weitere Informationen zur aktuellen Situation erhalten die Rübenpflanzerrinnen und Rübenpflanzler laufend über die BetaSwiss-App. In Frauenfeld hat die Bio-Kampagne am 11. September erfolgreich begonnen – erstmals auch mit dem neuen Kalkofen. Die konventionelle Kampagne startet am 23. September in Aarberg und voraussichtlich am 24. September in Frauenfeld.

Le troisième sondage confirme les prévisions de rendement inférieures à la moyenne

Le troisième sondage a dans l'ensemble confirmé les déjà faibles attentes du deuxième sondage. Bien que des précipitations soient survenues depuis la mi-août dans l'ensemble du territoire, celles-ci n'ont, comme prévu, pas permis de compenser le déficit accumulé durant les mois d'été chauds et secs. La situation s'est notamment encore détériorée dans les parcelles fortement touchées par le charançon. Cela se reflète également dans les chiffres actuels. Dans les deux régions, une certaine augmentation du rendement a encore été constatée par rapport au deuxième sondage. Le rendement estimé a augmenté de 16,6 t/ha dans la région ouest et de 17,4 t/ha dans la région est. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les sondages sont effectués à la main et que les rendements ainsi déterminés sont, par expérience, environ 15 à 20 % supérieurs à ceux obtenus lors d'une récolte mécanique.

L'augmentation des rendements à l'hectare s'accompagne toutefois d'une diminution parfois importante de la teneur en sucre. L'augmentation du rendement en betteraves est ainsi en grande partie neutralisée. En conséquence, les rendements en sucre attendus par hectare sont également nettement inférieurs à la moyenne des dernières années. De plus, l'efficacité d'extraction, clairement inférieure à la moyenne, complique encore la situation. Cela s'explique notamment par les teneurs élevées en amino-N dans les betteraves, dues à la sécheresse. Des teneurs élevées en amino-N compliquent la cristallisation du saccharose et entraînent ainsi des pertes de sucre plus importantes dans la mélasse.

Dans l'ouest de la Suisse, Sucre Suisse SA estime actuellement à environ 400 à 800 ha les surfaces qui pourraient subir une perte totale. Ce chiffre doit être interprété avec précaution et peut encore évoluer en fonction du développement des parcelles. Les planteurs et planteuses sont donc priés d'annoncer les pertes totales à Sucre Suisse SA. Cela permet de planifier la logistique de manière aussi efficace que possible et d'éviter des frais inutiles. Avec la baisse des températures, le risque de contaminations secondaires diminue. Jusqu'à fin octobre, il est recommandé de procéder à l'arrachage le plus près possible de la date de chargement, les betteraves se conservant mieux en terre qu'en tas. Les plans de chargement sont maintenus tels que prévus. Les parcelles concernées doivent continuer à être surveillées régulièrement. Toute apparition éventuelle de pourritures doit être annoncée à Sucre Suisse SA. Les planteurs et planteuses recevront régulièrement des informations sur la situation actuelle via l'application BetaSwiss. À Frauenfeld, la campagne bio a débuté avec succès le 11 septembre, pour la première fois également avec le nouveau four à chaux. Le début de la campagne conventionnelle est prévu le 23 septembre à Aarberg et, sous réserve, également le 23 septembre à Frauenfeld.

Aarberg, 17.09.2026

Schweizer Zucker AG
Sucre Suisse SA

Radelfingenstrasse 30
Postfach
CHF-3270 Aarberg
T +41 (0)32 391 62 00
F +41 (0)32 391 62 40

Oberwiesenstrasse 101
Postfach
CH-8502 Frauenfeld
T +41 (0)52 724 74 00
F +41 (0)52 724 74 90

info@zucker.ch
www.zucker.ch
www.sucre.ch